

LINFADENECTOMIA TORÁCICA SUPERIOR NO CARCINOMA DO ESÓFAGO

UPPER THORACIC FIELD LYMPHADENECTOMY FOR OESOPHAGEAL CARCINOMA

 FRANCISCO CABRAL¹,  PAULO RAMOS¹,  CECÍLIA MONTEIRO¹,
 RUI CASACA¹,  NUNO ABECASIS¹

¹ Cirurgia geral IPOLFG

 <https://www.youtube.com/watch?v=mxbwOHBHp24>

A neoplasia do esófago é a sexta causa de morte neoplásica a nível mundial e a sua incidência tem vindo a aumentar. A cirurgia com correspondente linfadenectomia é o único tratamento com intenção curativa.

A linfadenectomia mediastínica superior aborda os gânglios do grupo 105, 106 recR e L, 106 tbR e tbL e 106 pre. A linfadenectomia destes territórios está indicada para tumores situados tanto a nível do terço superior como médio como inferior do esófago torácico.

É importante a sistematização das indicações e da técnica cirúrgica adequada para abordagem deste território.

Este vídeo mostra, de forma sistematizada, a linfadenectomia torácica superior, via aberta, realçando as indicações, a anatomia desta zona e a forma de realizar esta linfadenectomia com a menor morbilidade possível.

Correspondência:

FRANCISCO CABRAL
e-mail: francisco.cabrall@gmail.com

Data de recepção do artigo:

02/06/2020

Data de aceitação do artigo:

26/06/2020

